

variétés. Les *Tapes texturatus* et *T. lucens* nous paraissent de bonnes espèces.

Nous serions heureux si ce rappel de tant de travaux pouvait provoquer quelques éclaircissements sur nombre de formes restées énigmatiques, et sur tant d'observations incomplètes.

(A suivre).

G.-F. DOLLFUS.

Sur une nouvelle variété de *CHLAMYS OPERCULARIS*

par Ph. DAUTZENBERG.

M. Paul de Septenville, du Croisic, nous communique quelques *Chlamys* (*Aequipecten*) *opercularis* Linné, prélevés sur un lot de trois à quatre mille exemplaires provenant d'un même dragage effectué au commencement du mois d'octobre dernier au delà de Belle-Ile et un peu au Nord, par 175 à 200 mètres de profondeur. M. de Septenville, qui a pu examiner ce lot entier lorsqu'il a été apporté au Croisic, a été frappé de l'uniformité de ces *Chlamys* sous le rapport de la forme aussi bien que de la coloration. Ainsi qu'il l'a observé, ils sont tous sensiblement plus obliques que ceux rapportés habituellement par les pêcheurs dans nos ports de l'Océan ; ils ont tous les oreillettes petites ; leur valve gauche est constamment très bombée au centre, enfin leur coloration est entièrement blanche, sauf quelques marbrures rougeâtres qui ornent le voisinage des sommets sur la valve gauche. Par leur obliquité, ces *Chlamys* rappellent une forme méditerranéenne bien connue ; mais chez laquelle le test est toujours plus mince, la valve gauche moins convexe et les oreillettes plus développées.

Nous proposons d'attribuer à l'intéressante variété que M. de Septenville vient de nous faire connaître, le nom de var. *Septenvillei*.

Ph. D.